



Reduzir o risco de quedas



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**

IMPLANTACÃO DO PROGRAMA NACIONAL
DE SEGURANÇA DO PACIENTE

Quem irá perguntar e quem irá responder?

Selecionar sempre 2 participantes para responder cada uma das perguntas. São 10 cards com perguntas e respostas. Antes de realizar a atividade, estes receberão uma moeda para jogar e escolher quem irá perguntar e quem irá responder.

Em uma das faces da moeda temos “**Pergunto**” e na outra face “**Respondo**”.

A cada pergunta, dois novos participantes deverão jogá-las para cima, estabelecendo assim, quem irá perguntar e quem irá responder até completar 10 duplas.

GABARITO

1. A avaliação do risco de quedas deve ser realizada somente em pacientes idosos e crianças?

R: NÃO

2. A avaliação do risco de quedas deve ocorrer de forma padronizada?

R: SIM

3. É correto comunicar e educar pacientes e familiares quanto ao risco de quedas?

R: SIM

4. A avaliação do risco de quedas deve ser realizada a qualquer momento durante a internação do paciente?

R: SIM

5. É sugerido a utilização de escadas recomendadas para avaliação de risco?

R: SIM

6. O uso de medicamentos benzodiazepínicos é um fator de risco para as quedas?

R: SIM

7. Pacientes acamados e restritos ao leito têm alto risco para quedas?

R: NÃO

8. Deixar a cama baixa e travada é uma medida para prevenir quedas?

R: SIM

9. Não é responsabilidade da instituição avaliar e tratar o paciente que sofreu uma queda?

R: NÃO

10. Vestuário adequado e calçado fixo ao pé são importantes para prevenir quedas?

R: SIM







PERGUNTA

1. A avaliação do risco de quedas deve ser realizada somente em pacientes idosos e crianças?

R: NÃO



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**





PERGUNTA

2. A avaliação do risco de quedas deve ocorrer de forma padronizada?

R: SIM



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**





PERGUNTA

3. É correto comunicar e educar pacientes e familiares quanto ao risco de quedas?

R: SIM



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**





PERGUNTA

4. A avaliação do risco de quedas deve ser realizada a qualquer momento durante a internação do paciente?

R: SIM



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**





PERGUNTA

5. É sugerido a utilização de escalas recomendadas para avaliação de risco?

R: SIM



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**





PERGUNTA

6. O uso de medicamentos benzodiazepínicos é um fator de risco para as quedas?

R: SIM



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**





PERGUNTA

7. Pacientes acamados e restritos ao leito têm alto risco para quedas?

R: NÃO



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**





PERGUNTA

8. Deixar a cama baixa e travada é uma medida para prevenir quedas?

R: SIM



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**





PERGUNTA

9. Não é
responsabilidade da
instituição avaliar e
tratar o paciente que
sofreu uma queda?

R: NÃO



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**





PERGUNTA


10. Vestuário adequado e calçado fixo ao pé são importantes para prevenir quedas?

R: SIM



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**







HM-0023-17B Jogo Perguntas-Quedas





HM-0023-17B Jogo Perguntas-Quedas





HM-0023-17B Jogo Perguntas-Quedas

